



ДЕСКВАМАТИВНЫЙ ГЛОССИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С *HELICOBACTER PYLORI* (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Л.Д.Гожая, Г.Ф.Мамедова

Кафедра ортопедической стоматологии ФПДО МГМСУ



Десквамативный глоссит (географический язык), воспалительное заболевание слизистой оболочки языка, может быть самостоятельным поражением, но зачастую является симптомом патологии внутренних органов и систем (желудочно-кишечного тракта, нервной и эндокринной систем), коллагенозов, болезней крови и кроветворных органов. В настоящее время установлено, что *Helicobacter pylori* (НР) вызывает не только патологию желудочно-кишечного тракта, но и способствует развитию внегастральных изменений - стоматологических заболеваний [3,4].

НР - это грамотрицательные, неспорообразующие бактерии спиралевидной формы, их длина колеблется от 2 до 6.5 мкм, ширина - от 0.5 до 0.6 мкм (рис.1). Впервые НР была описана в 1983г. австрийскими учеными В.Marshall и I.Karren [2]. Согласно современным исследованиям, около 60% населения земного шара инфицированы НР [1,5]. D.Y.Graham считает НР, наряду со *Streptococcus mutans*, вызывающими кариес, наиболее частой инфекцией человека.

Продуцируя уреазу, оксидазу, гемолизин, щелочную фосфатазу, протеазу, муциназу, гамма-глутамилтрансферазу, фосфолипазы А и С, цитотоксины и липид А, данные бактерии успешно колонизируют слизистую оболочку желудка, персистируют в ней и, преодолевая защитные барьеры, оказывают повреждающее действие на слизистую. Наиболее благоприятными условиями для роста и размножения НР являются температура 37-42° и рН среды 4.0-6.0, что характерно для начальных отделов желудочно-кишечного тракта.

РЕЗЮМЕ

Показана необходимость обследования пациентов с десквамативным глосситом у гастроэнтеролога с целью выявления *Helicobacter pylori*, эрозивного язвенного гастрита. При сочетании гальваноза с воспалительным заболеванием языка требуется комплексное лечение у врача-стоматолога ортопеда и гастроэнтеролога.

Ключевые слова:
десквамативный глоссит,
Helicobacter pylori




Рис.1.
Helicobacter pylori




Рис. 2. Пациент Н. с десквамативным глосситом до (А) и после (Б) лечения у гастроэнтеролога

ЦЕЛЬ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ - установить взаимосвязь между воспалительным заболеванием языка (десквамативным глосситом) и *Helicobacter pylori*, вызывающей хронический гастрит.

В 2011г. в клинику ортопедической стоматологии ФПДО МГМСУ им.А.И.Евдокимова обратился пациент Н. с жалобами на жжение всей поверхности языка, не проходящее во время еды. Жалобы появились сразу после протезирования. Разность потенциалов в полости рта составляла 165 мВ. При проведении клинко-лабораторного обследования был поставлен диагноз «частичная адентия, десквамативный глоссит, гальваноз». После замены протезов на литые коронки и бюгельный протез жалобы частично сохранились.

В 2012г. пациент Н. повторно обратился в клинику с теми же жалобами. Со слов пациента, он ранее перенес операцию по удалению дивертикула кишечника, много лет страдает остеохондрозом, за консультацией к гастроэнтерологу не обращался.

При внутриворотном обследовании слизистая оболочка языка отечна и гиперемирована, на языке имеется налет, определяются очаги десквамации размером 2х7 мм (рис. 2А). Анализ крови на НР показал сильно положительный титр антител IgM, IgA и IgG к *Helicobacter pylori* - 1:40. Гастроэнтерологом был поставлен диагноз «типоацидный гастрит, ассоциированный с НР». По его назначению пациент в течение 14 дней получал адекватную эрадикационную терапию.

После лечения жалобы на жжение языка исчезли. Слизистая оболочка языка была бледно-розовая, без отека и очагов десквамации (рис. 2Б). Наблюдалось полное клиническое выздоровление. Пациенту рекомендовали диспансерное наблюдение и посещение стоматолога раз в три месяца.

P.S. Таким образом, десквамативный глоссит в стадии обострения может ассоциироваться с *Helicobacter pylori*. В связи с этим, необходимо обязательное обследование данных пациентов у гастроэнтеролога на предмет выявления НР, эрозивного язвенного гастрита и т.д. При сочетании гальваноза с десквамативным глосситом требуется комплексное лечение у врача-стоматолога ортопеда и гастроэнтеролога.

Литература

1. Ивашкин В.Т., Мегро Ф., Лапина Т.Л. *Helicobacter pylori*: революция в гастроэнтерологии. - М.: Трида Х., 2000.
2. Маев И.В. *Helicobacter pylori*: эпидемиология, диагностика, основы эрадикационной терапии (учебно-методическое пособие). - М., 2000. - С.4-15.
3. Робакидзе Н.С. Состояние полости рта у *Helicobacter pylori*-инфицированных больных при различных вариантах течения язвенной болезни: Автореф. дисс... канд.мед.наук / СПб., 2000 - 20 с.
4. Nguyen A.M., el-Zaatari F.A., Graham D.Y. *Helicobacter pylori* in the oral cavity. A critical review of the literature. // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 1995. - №6. - P.705-708.
5. Tursi A., Cammarota G. et al. The modes of transmissin of *Helicobacter pylori* infection. // Recent i-Prog Med. - 1997. - V.88, №5. - P.232-236.

Контактная информация
для переписки:
mamedova-qamar@mail.ru

SUMMARY *Glossitis areata exfoliativa* associated with *Helicobacter* *pylori* (clinical case)

L.D.Gozhaya,
G.F.Mamedova

The clinical study proves the necessity of patients with glossitis areata exfoliativa examination by a gastroenterologist for identification of *Helicobacter pylori* and ulcerative erosive gastritis. When combined with galvanosis a comprehensive treatment is required both by dentist and gastroenterologist.

Key words:
glossitis areata exfoliativa,
Helicobacter pylori